

# Kiefern- oder Forleule (Panolis flammea)

Wenn es zu einer Massenvermehrung kommt, verursacht sie schwere Schäden. Besonders gefährdet sind 40-80-jährige Kiefernbestände mit einem maximalen Niederschlag von 800 mm. Für einen Befall charakteristisch ist der frühe Beginn im Mai/Juni. Durch den frühen Fraß wird die Kiefer vor Anlage der neuen Knospen geschädigt, was die Gefahr des Absterbens nach einmaligem Kahlfraß erhöht. Erreicht die Massenvermehrung ihren Höhepunkt werden Kiefernkronen bereits Ende Mai/ Anfang Juni braun.[1]



## Quellen:

[1] [Die Kiefern- oder Forleule](#), Online auf waldwissen.net, Zugriff am 12. September 2019

From:  
<https://www.wald-wiki.de/> -

Permanent link:  
[https://www.wald-wiki.de/klima\\_u\\_fowi/waldschutz/biot\\_schaeden/insekten/kiefern\\_oder\\_forleule?rev=1605034923](https://www.wald-wiki.de/klima_u_fowi/waldschutz/biot_schaeden/insekten/kiefern_oder_forleule?rev=1605034923)

Last update: 2020/11/10 20:02

